

Bestrijding van Spint (mix) (26,50 EUR)



Locatie

Groningen, Groningen

<https://www.advertentiex.nl/x-1164670-z>



Spint bestrijding met *Amblyseius californicus* en *Phytoseiulus persimilis* (mix) Voor een totale en langdurige bestrijding van spint adviseren wij een mix van de *Amblyseius californicus* roofmijt en *Phytoseiulus persimilis* roofmijt. Deze roofmijten hebben wij leverbaar in de volgende verpakking: De mix bestaat uit 1.000 stuks *Phytoseiulus persimilis* en 500 stuks *Amblyseius californicus* roofmijten. Dit is voldoende voor 20 m². De mix wordt geleverd in strooivorm met daarin eierklare roofmijt vrouwtjes, jonge en volwassen exemplaren.

Spint bestrijden met *Amblyseius californicus* De *Amblyseius californicus* kan worden ingezet voor een effectieve en langdurige bestrijding van alle stadia van spint (o.a. kasspint en fruitspint). De *californicus* richt zich op alle stadia van spint met voorkeur voor de jongere stadia. Bij afwezigheid van prooien kan de *A. californicus*, in tegenstelling tot de *Phytoseiulus*, ook overleven op het aanwezige stuifmeel van de planten. De roofmijt kan langere tijd zonder eten en is vooral geschikt als preventief middel tegen spint. Eitjes van de *Phytoseiulus* komen uit in 2-3 dagen. Ontwikkeling van ei naar volwassen roofmijt is zo'n 5 dagen bij de optimale temperatuur. Bij een lagere of hogere temperatuur kan dit zo'n 25 dagen duren. Tijdens haar 35 dagen durende leven legt een volwassen vrouwtje zo'n 60 eieren. De eieren zijn ovaal van vorm en zo'n 0,3mm lang.

Wat is de *Phytoseiulus persimilis* De *Phytoseiulus persimilis* is een fel rood gekleurde roofmijt met hoge poten en is zeer beweeglijk. Deze roofmijt voedt zich uitsluitend met spintmijten (*Tetranychus* spp.) en wordt vooral ingezet wanneer er al sprake is van een spint infectie en is vooral geschikt als correctief middel tegen spint. Een volwassen *Phytoseiulus* is een echte spint killer en eet per dag zo'n 5-25 prooien in de vorm van spinteieren/ larven, nimfen en volwassen spintmijten. Een volwassen vrouwtje legt bij de juiste omstandigheden zo'n 2-3 eieren per dag. Deze eitjes worden aan de onderkant van bladeren gelegd in de buurt van te bestrijden

spintmijten. De eieren komen gebruikelijk na 1-2 dagen uit. De geboren larve heeft 6 poten en ontwikkelt zich in één dag tot een waargenomen 12-potige spintmijten. Het zelfde ontwikkelingsproces kan ook in 10 dagen plaatsvinden afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid van de omgeving. Het is belangrijk om de roofterm en de luchtvochtigheid op 20-27 graden te houden. Tijdens haar volwassen leven legt de spinnetje zo'n 4-5 eieren af. De amblyseus en phytoseius persimilis zijn twee samenwerkende teamleden in de bestrijding van spint in uw planten. Beide bestrijders zijn ook los te bestellen, klik hier voor de Amblyseius biformis en hier voor de Phytoseius persimilis. Temperatuur en luchtvochtigheid De optimale temperatuur is tussen de 20 tot 27 graden. Optimale luchtvochtigheid rond de 60%. Bij temperaturen boven de 30 graden en een luchtvochtigheid van minder dan 60% verminderen de roofterm zich langzamer dan de spintmijten in die situatie moet u nauwkeurig de gaten houden of de inzet van de roofterm effect hebben. Het kortstondig, dagelijks meerdere keren sproeien van de planten bevordert de ontwikkeling en reproductie van roofterm. Uitzet instructie Zet de Amblyseius Phytoseius mix preventief



Bestrijding van Spint (mix)

<https://www.advertentix.nl/x-1164-670-z>



Bestrijding van Spint (mix)

<https://www.advertentix.nl/x-1164670-z>



Bestrijding van Spint (mix)

<https://www.advertentix.nl/x-1164670-z>



Bestrijding van Spint (mix)

<https://www.advertentix.nl/x-1164670-z>



Bestriding Van Spint (mix)

https://www.advancesinartificialintelligence.org/article/view/1164



Bestselling Van Spirit (mix)

<https://www.adherentietix.nl/x-1164670-z>



De tijd die u nodig heeft om de cursus af te maken, hangt af van uw kennis van de Nederlandse taal en de tijd die u beschikbaar heeft om de cursus te volgen. De cursus is bedoeld voor mensen die minimaal 18 jaar oud zijn en de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreken. De cursus duurt in totaal 12 weken, met een lesduur van 1,5 uur per week. U kunt de cursus volgen op werkdagen of op zaterdag. De cursus is gratis, maar er zijn kosten verbonden aan de cursusmateriaal en de examenkosten.

6-10-2019
hans.w.van.der.pijl@text.nl/x-1164



enheid van de Am

<https://www.advocatentix.nl/x-1164>



De
Bij te
de
of d
play
seiu

60-2



Bestrijding Van spint (mix)

6-0-99

in of zo snel mogelijk na de eerste verschijning van spintmijten. Na ontvangst zo snel mogelijk uitzetten, roofmijten zijn niet houdbaar. Open de verpakking en verdeel het materiaal gelijkmatig over de planten. Indien er sprake is van een spinthaard (concentratie van spint) zorg ervoor dat u het materiaal dan dichtbij en rondom de haard uitzet. In de verpakking kunnen soms eitjes of roofmijten achterblijven, advies is om de verpakking nog enkele dagen in de ruimte te laten liggen zodat ook de achtergebleven eitjes en roofmijten de kans hebben om in actie te komen. Herhaal de inzet elke 2-4 weken, afhankelijk van de ontwikkeling van de besmetting. Bewaaradvies Biologische bestrijders zijn levende dieren en hebben een (zeer) korte levensduur en moeten daarom zo snel mogelijk na ontvangst in het gewas worden geïntroduceerd. Opslag kan de kwaliteit nadelig beïnvloeden en kan uitsluitend onder de hieronder aangegeven condities. Houdbaarheid: 7 dagen gekoeld Bewaartemperatuur: 8-10°C In het donker Liggend