

Bloedluisval Roofmijten Pakket (41,36 EUR)



Locatie **Noord-Holland, Amsterdam**
<https://www.advertentiax.nl/x-1289699-z>



Bloedluisval in combinatie met roofmijten Wij adviseren om in combinatie met de bloedluisval ook roofmijten in te zetten. De roofmijten richten zich op de eieren en jongere stadia van de bloedluizen. De bloedluisval richt zich op de jonge en volwassen stadia van de bloedluizen waardoor u een volledige bestrijding heeft. De roofmijt jaagt mogelijk ook de bloedluis op en de bloedluis gaat zich dan juist verbergen in de bloedluisval. Met dit pakket heeft u beide producten in 1 keer in huis. Bloedluisval De bloedluisval is een karton van 14 bij 20 cm welke is voorzien van een feromoon (lokstof) waarop bloedluizen op af komen. Het ligt in de aard van bloedluizen om zich te verstoppen in kieren en gaten zolang ze niet op jacht zijn, het kartonnetje is dan ook een ideale plek voor de mijten om zich te verstoppen. Zodra de bloedluizen in het karton zitten kunt u het karton verwijderen en legen (of vernietigen) waardoor u (en vooral uw dieren) minder last hebben van de bloedluizen. Een effectieve bestrijding van de levende bloedluizen. De val kunt u aan de wand van het kippenhok ophangen, de val is aan de achterkant voorzien van een stukje dubbelzijdige tape zodat u het makkelijk kunt bevestigen in een hok. Hang de val op in de buurt van de meest geïnfecteerde plaats(en) en op de plaatsen waar de kippen rusten. De Hypoaspis roofmijten De Hypoaspis miles is een bodemroofmijt die ook bekend staat onder de naam Stratiolaelaps scimitus. Deze roofmijt richt zich op een breed scala aan insecten en wordt veel toegepast in de tuinbouw maar is ook bruikbaar als natuurlijk vijand van de bloedmijt (bloedluis). De Hypoaspis gedijt het beste bij een luchtvochtigheid van zo'n 70% en heeft het liefst hoge temperaturen van 20 tot 30 graden. Bij deze omstandigheden zal de roofmijt zich veelvuldig vermenigvuldigen en de bloedluis het beste bestrijden. De benodigde hoeveelheid roofmijten is afhankelijk van de grootte van het hok en de hoeveelheid dieren, over het algemeen adviseren wij 200 roofmijten per dier. De roofmijten

 https://www.advertentiax.nl/x-1289699-z Bloedluisval Pakket Roofmijten	 https://www.advertentiax.nl/x-1289699-z Bloedluisval Pakket Roofmijten	 https://www.advertentiax.nl/x-1289699-z Bloedluisval Pakket Roofmijten	 https://www.advertentiax.nl/x-1289699-z Bloedluisval Pakket Roofmijten	 https://www.advertentiax.nl/x-1289699-z Bloedluisval Pakket Roofmijten	 https://www.advertentiax.nl/x-1289699-z Bloedluisval Pakket Roofmijten	 https://www.advertentiax.nl/x-1289699-z Bloedluisval Pakket Roofmijten	 https://www.advertentiax.nl/x-1289699-z Bloedluisval Pakket Roofmijten	 https://www.advertentiax.nl/x-1289699-z Bloedluisval Pakket Roofmijten	 https://www.advertentiax.nl/x-1289699-z Bloedluisval Pakket Roofmijten
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---

worden geleverd in zakken met daarin strooisel (een soort van potgrond) met daarin de eitjes, jonge en volwassen roofmijten. De roofmijten zijn van een soort die is specifiek voor de bestrijding van bloedluizen. Het hok moet worden voorzien van de plaatsen waar de bloedluizen overdag verblijven. Bijvoorbeeld: de kippen van de kooi in nestplaatsen op plaatsen waar de kippen meestal voer zoeken. Het is belangrijk dat de val hangt op een plek waar de kippen in de nacht de val laten hangen. U kunt de val ophangen gedurende het hele seizoen ongeacht of er een lage of hoge bloedluisbesmetting is. Ons advies is om de val 5 dagen in het hok te hangen. Het eerste uit te hangen om te kijken of er veel bloedluizen in de val zitten. Neem de val uit het hok en leg deze door het uit te kloppen in bijvoorbeeld een kartonnen doos. Als er sprake is van bloedluizen in het hok dan zullen er nu ook zeker bloedluizen uit de val vallen. Denk erom dat je de doos met bloedluizen vervolgens verbrand of afvoert van de plek waar de infectie oorspronkelijk was. Herhaal dit proces om de 5 dagen nog sneller als er een grote populatie bloedluizen aanwezig is. caption id="attachment_29403"

align="alignright" width="300"] Resultaat na 5 dagen[/caption]Herhaal de inzet van de bloedluisval na 14 dagen. Het advies is om dit het meerdere keren per seizoen te doen. Op deze manier wordt de cyclus van een bloedluis gevolgd en worden de eieren en jonge bloedluis ook verwijderd. Na 25 dagen moet u de val definitief verwijderen. Op dat moment zijn er ook veel eitjes in de val afgelegd. Steek de val terug in het plastic zakje waarin ze werd geleverd en sluit het zakje goed af. Gooi het vervolgens bij de restafval. U mag de vallen uiteraard ook eerder vervangen. Bij een grote populatie bloedmijten is dit zeker aan te raden. TIP: de val is voorzien van een regel waarop u de datum van uithangen kunt noteren. Zo weet u ook wanneer de val verwijderd moet worden. Monitoren/ signaleren van bloedluisinfectie De val kan naast bestrijdingsmiddel ook ingezet worden als monitor voor het signaleren van bloedluizen. Als u de val vroeg in het jaar ophangt en regelmatig inspecteert kunt u vroegtijdig signaleren wanneer de bloedluizen actief worden zodat u maatregel kunt nemen zoals het inzetten van roofmijten, extra vallen en het reinigen van het hok. Kijk ook eens op deze pagina voor meer tips over het bestrijden van bloedluis. Houdbaarheid De val kan voor ca. 1 jaar op een koele en droge plek bewaard worden. Bij voorkeur niet in de vriezer aangezien dan de kans bestaat dat het karton nat en week wordt. Website www.biobestrijding.nl/?post_type=product&p