

Bestrijding van Varenrouwmug met roofmijten (11,75 EUR)



Locatie

Noord-Holland, Amsterdam

<https://www.advertentiex.nl/x-1289701-z>



Varenrouwmug bestrijden met roofmijt Voor een preventieve bestrijding van de varenrouwmug leveren wij de *Hypoaspis miles* (*Stratiolaelaps scimitus*) roofmijt. De *Hypoaspis miles* is een bodemroofmijt die een breed scala aan insecten bestrijdt. Deze roofmijt leeft in de bovenste grondlaag tot 4 cm diep en kan zich snel door de grondlaag bewegen en voelt zich thuis in vochtige (pot)grond. De *Hypoaspis* richt zich voornamelijk op de eieren, larven en poppen van varenrouwmuggen (*Sciaridae*), met voorkeur voor kleinere larven. De *Hypoaspis* werkt niet tegen de reeds aanwezige volwassen exemplaren. Doordat de *Hypoaspis* zich richt op de eitjes en jonge tripsen in de bodem is deze roofmijt vooral geschikt als preventief middel tegen de varenrouwmug.

Levenswijze *Hypoaspis miles* Een volwassen *Hypoaspis* roofmijt leeft gemiddeld 6 weken en is actief bij temperaturen van 10 °C tot 28 °C. De geslachtsverhouding is gelijk aan 1:1, vrouwen en mannen. Als er voldoende te eten is leggen de vrouwtjes veelvuldig eieren. De eieren komen binnen 2-3 dagen uit en de jonge *Hypoaspis* nimfen zijn geboren. Deze jonge nimfen zijn direct na hun geboorte felle roofdieren die eieren, larven en poppen van varenrouwmuggen consumeren. Elke volwassen *Stratiolaelaps* kan 1 tot 5 prooien per dag consumeren. De *Hypoaspis* populatie kan ook overleven in de afwezigheid van ongedierte. In dat geval voeden ze zich met algen en plantenresten. Als het moet kan de *Hypoaspis miles* populatie echter ook tot 7 weken zonder voedsel door over te gaan in een rustfase.

Hoeveel roofmijten heeft u nodig Deze roofmijten worden geleverd in een verpakking met strooimateriaal met daarin eitjes, jonge en volwassen roofmijten. Een verpakking met 2500 stuks roofmijten is voldoende voor ca. 10 vierkante meter afhankelijk van hoeveel last u heeft van varenrouwmuggen. Wij adviseren over het algemeen 250 tot 500 stuks roofmijten per vierkante meter. Na één tot twee weken is het goed om een onderhoudsdosering te geven



Bestrijding van Varenrouwmug met roofmijten

<https://www.advertentiaex.nl/x-1289>



Bestrijding van Varenrouwmug met roofmijten

<https://www.advertentix.nl/x-1289701-z>



Bestrijding van Varenrouwmug met roofmijten

<https://www.advertentiax.nl/x-1289701-z>



Bestrijding van Varenrouwmug met roofmijten

<https://www.advertentix.nl/x-1289701-z>



Bestrijding van
Varende wormen met roofterijten

<https://www.adventia.nl/x-1289701-z>



Bestriding van Varende wraam met roofmijten

<https://www.advententix.nl/x-1289761-2>




Van zijn
gelijk
of roo
llege
vies
mze

<http://www.advententice.nl/x-1289701-2>



**Bestrijding van
Varenrozwurm met rooftermijten**

<https://www.advertentiax.nl/x-12897d1-z>



**Bestrijding van
Varenrooiming met rooftern**

701-777-7777
advantext.nl/x-1289



Bestrijding van Varenrouwmug met roofmijten

<https://www.advancesinmathematics.nl/x-1289>

geïntroduceerd. Opslag kan de kwaliteit nadelig beïnvloeden en kan uitsluitend onder de hieronder aangegeven condities. Houdbaarheid: 1-2 dagen Bewaartemperatuur: 8-10°C In het donker Liggend bewaren
Website www.biobestrijding.nl/?post_type=product&p