

Bestrijding van Trips (preventief) (9 EUR)



Locatie


Noord-Holland, Amsterdam

<https://www.advertentiax.nl/x-1289702-z>



Trips bestrijden met roofmijt Voor een preventieve bestrijding van trips leveren wij de Hypoaspis miles (Stratiolaelaps scimitus) roofmijt. De Hypoaspis miles is een bodemroofmijt die een breed scala aan insecten bestrijdt. Met name de tripspoppen en -larven staan op het programma maar ook andere insecten zoals larven en poppen van varenrouwmuggen, stromijten, bolmijten, springstaarten, bloedluis en de larven van de mot Duponchelia. Deze roofmijt leeft in de bovenste grondlaag tot 4 cm diep en kan zich snel door de grondlaag bewegen en voelt zich thuis in vochtige (pot)grond. Doordat de Hypoaspis zich richt op de eitjes en jonge tripsen in de bodem en niet op de volwassen tripsen is de Hypoaspis vooral geschikt als preventief middel tegen trips. Wilt u ook een oplossing tegen de aanwezige, volwassen tripsen? Dan heeft u de Orius roofwants nodig. Advies is om de Hypoaspis gezamenlijk met de Orius uit te zetten voor een totale bestrijding. Levenswijze Hypoaspis miles Een volwassen Hypoaspis roofmijt leeft gemiddeld 6 weken en is actief bij temperaturen van 10 °C tot 28 °C. De geslachtsverhouding is gelijk aan 1:1, vrouwen en mannen. Als er voldoende te eten is leggen de vrouwtjes veelvuldig eieren. De eieren komen binnen 2-3 dagen uit en de jonge Hypoaspis nimfen zijn geboren. Deze jonge nimfen zijn direct na hun geboorte felle roofdieren die eieren en kleine tripslarven consumeren. Elke volwassen Stratiolaelaps kan 1 tot 5 prooien per dag consumeren. De Hypoaspis populatie kan ook overleven in de afwezigheid van ongedierte. In dat geval voeden ze zich met algen en plantenresten. Als het moet kan de Hypoaspis miles populatie echter ook tot 7 weken zonder voedsel door over te gaan in een rustfase. Hoeveel roofmijten heeft u nodig Deze roofmijten worden geleverd in een verpakking met strooimateriaal met daarin eitjes, jonge en volwassen roofmijten. Een verpakking met 2500 stuks roofmijten is voldoende voor ca. 10 vierkante meter afhankelijk van hoeveel last u heeft van

trips. Wij adviseren over het algemeen 250 tot 500 stuks roofmijten per vierkante meter. Na één tot twee weken goed onderhoud kan u geven dat u nu als 250 stuks de vierkante meter. Het is goed om te weten dat een tripspop kan worden gevonden op een oppervlakte van 1 tot 2 meter. De aanwezigheid van trips in de bodem kan worden vastgesteld door de bodemtemperatuur van 15 graden. De optimale temperatuur is tussen de 20 tot 30 graden. 26 graden is het meest ideaal voor de ontwikkeling. Het is belangrijk om de eerste verspreiding van trips. Na ontvangst zo snel mogelijk uitzetten, roofmijten zijn niet houdbaar. Open het vakje met daarin het strooimateriaal en roofmijten. Verdeel het materiaal gelijkmatig over de (licht) vochtige bodem/ grond van de planten. In de verpakking kunnen soms eitjes of roofwantsen achterblijven, advies is om de verpakking nog enkele dagen (ca. 2) in de ruimte te laten liggen zodat ook de achtergebleven eitjes en roofmijten kans hebben om in actie te komen. Combinatie van Orius en



Bestrijding van Trips (preventief)

<https://www.advertentiax.nl/x-1289702-z>



Bestrijding van Trips (preventief)

<https://www.advertentiax.nl/x-1289702-z>



Bestrijding van Trips (preventief)

<https://www.advertentiax.nl/x-1289702-z>



Bestrijding van Trips (preventief)

<https://www.advertentiax.nl/x-1289702-z>



Bestrijding van Trips (preventief)

<https://www.advertentiax.nl/x-1289702-z>



Bestrijding van Trips (preventief)

<https://www.advertentiax.nl/x-1289702-z>



Bestrijding van Trips (preventief)

<https://www.advertentiax.nl/x-1289702-z>



Bestrijding van Trips (preventief)

<https://www.advertentiax.nl/x-1289702-z>



Bestrijding van Trips (preventief)

<https://www.advertentiax.nl/x-1289702-z>



Bestrijding van Trips (preventief)

<https://www.advertentiax.nl/x-1289702-z>

Hypoaspis voor een totale trips bestrijding Voor een optimale bestrijding van trips adviseren wij om de Orius roofwants in combinatie met de Hypoaspis roofmijt uit te zetten. Waar de Orius zich richt op de nimfen én volwassen tripsen richt de Hypoaspis roofmijt zich vooral op de eitjes en nimfen in de bodem. Deze 2 predatoren gecombineerd zorgen voor een totale bestrijding van tripsen. Bewaaradvies Biologische bestrijders zijn levende dieren en hebben een (zeer) korte levensduur en moeten daarom zo snel mogelijk na ontvangst in het gewas worden geïntroduceerd. Opslag kan de kwaliteit nadelig beïnvloeden en kan uitsluitend onder de hieronder aangegeven condities. Houdbaarheid: 1-2 dagen Bewaar temperatuur: 8-10°C In het donker Liggend bewaren Website www.biobestrijding.nl/?post_type=product&p