

Heterorhabditis bacteriophora aaltjes tegen engerlingen (16,50 EUR)



Locatie

Groningen, Groningen

<https://www.advertentiex.nl/x-1507978-z>



Heterorhabditis bacteriophora aaltjes tegen engerlingenDe Heterorhabditis bacteriophora aaltjes (nematoden) zijn inzetbaar als biologische bestrijders van poppen en larven van verschillende keversoorten (engerlingen). Engerlingen zijn de ondergronds levende larven van kevers die tot de familie van de bladsprietkevers (Scarabaeidae) horen. Ze vreten aan de wortels en andere ondergrondse delen van allerlei soorten planten waardoor veel schade wordt aangericht. Deze engelingen kunnen goed bestreden worden door het inzetten van aaltjes. Na het inzetten van de aaltjes gaan ze direct op zoek naar hun prooi en dringen deze binnen waardoor de engelingen sterven. Onze aaltjes zijn leverbaar in de volgende verpakkingen: 10 miljoen (voor ca. 20 m²) 50 miljoen (voor ca. 100 m²) 250 miljoen (voor ca. 500 m²) Ze worden geleverd in mineraalpoeder wat klaar is om gemengd te worden met water. Met dit mengsel kunt u eenvoudig de bodem besproeien met een gieter, op deze pagina kunt een stap-voor-stap instructie vinden over het verdunnen en uitzetten van aaltjes. Welke schade richten engelingen aan? Ondergronds levende larven van kevers die tot de familie van de bladsprietkevers (Scarabaeidae) horen worden engelingen genoemd. Dit zijn kevers zoals de meikever, rozenkever en de junikever. Engelingen richten schade aan planten aan doordat ze de wortels en andere ondergrondse delen van planten aanvreten. Vooral in de periode tussen juli en september kan dit erg veel schade aanrichten waardoor bijvoorbeeld graslanden geel worden en gedeeltelijk afsterven. Ook grotere gewassen ontkomen niet aan de keverlarven en kunnen doodgaan door de schade die deze aan de wortels toebrengen. Daarnaast is er nog het nadelige effect van andere dieren die zich voeden met engelingen. Deze dieren (zoals vogels) gaan op zoek naar engelingen en brengen in hun zoektocht schade aan. Doordat de engelingen in de grond zitten zijn ze lastig te bereiken, het is dan ook belangrijk om het



Heterorhabdits bacteriophora
aaltjes tegen engelingen

<https://www.advertentiaex.nl/x-1507>



Heterorhabdits bacteriophora
aaltjes tegen engelingen

<https://www.advertentix.nl/x-1507978-z>



Heterorhabdits bacteriophora
aaltjes tegen engelingen

<https://www.advertentiax.nl/x-1507978-z>



Heterorhabdits bacteriophora
aaltjes tegen engelingen

<https://www.advertentiax.nl/x-1507978-z>



De Protonadris bacteriophora
aaitjes tegen engerlingen

<https://www.advertentia.nl/x-1507>
978-2



Herophaedus bacteriophora
aaltjes tegen engerlingen

<https://www.advertentie.nl/x-150798-2>




engelingen

<https://www.advertentiaex.nl/x-1507908-1>



engelingen

<https://www.advertentiax.nl/x-1507928-7>



Aastje
n ge
een b
damk
hade
oor zij
engelingen

<https://www.advertentie.nl/x-1507908-7>



Heteromaculatus bacteriophora
aaltes tegen engerlingen

<https://www.sciencedirect.com/journal/developmental-neurobiology>

beurt weer vermenigvuldigen. Een enkele insectenlarve kan het broeinest zijn van wel duizenden nematoden. De plaaginsecten worden dus belaagd door een waar leger aan aaltjes. Zodra de gastheer is gedood verlaten de aaltjes deze en gaan op zoek naar nieuwe gastheren. Zolang er prooien in de bodem aanwezig zijn kunnen de aaltjes zichzelf in stand houden en zich vermeerderen. **Temperatuur en omgeving** De aaltjes kunt u inzetten bij een bodemtemperatuur tussen de 12 °C en 30 °C liggen. Het is belangrijk dat de aaltjes worden toegepast op een vochtige grond die voor een optimale werking gedurende meerdere weken niet mag uitdrogen. Regelmatig sproeien bij droog weer is dus een must. Tijdens of vlak voor een regenbui is een ideaal moment om de aaltjes uit te zetten. Let op: niet uitzetten bij nachtvorst. **Uitzetinstructie aaltjes** Wanneer u de aaltjes precies moet uitzetten hangt af van de ontwikkelingsfase van de betreffende gastheer. Ideaal is dat de gastheer zich in een gevoelige staat bevindt zodat de aaltjes de prooien makkelijk kunnen penetreren. Omdat aaltjes zich alleen richten op de larven en poppen van de plaaginsecten kunnen ze het best worden uitgezet in het late voorjaar en vroege najaar. Wij adviseren zo'n 500.000 aaltjes per m² bij een lichte infectie. Bij een grotere infectie kunt u dit aantal verhogen naar 1 miljoen aaltjes per m². Deze inzet kunt u herhalen na 2-3 weken. Op deze pagina kunt een stap-voor-stap instructie vinden over het verdunnen en uitzetten van aaltjes. Uiteraard sturen wij ook een handleiding mee waarin dit duidelijk uitgelegd wordt. **Aaltjes gemakkelijk uitzetten** Voor het gemakkelijk, nauwkeurig en snel uitzetten van aaltjes kan je gebruik maken van de AquaNemix 1.25 V sproeier van Birchmeier. Deze sproeier is speciaal ontwikkeld voor het uitzetten van de aaltjes in de tuin en scheelt veel werk in vergelijking met het werken met gieters. Hoe het werkt? Heel eenvoudig, giet het mengsel van de aaltjes/ water (concentraat) eenvoudig in de tank, sluit de Aquamix aan op de waterslang en stel de gewenste concentratie in. De aaltjes worden vervolgens automatisch in de juiste concentratie aan het water toegevoegd. Deze sproeier is vooral interessant voor het uitzetten van aaltjes over grotere oppervlaktes 50 m² en meer maar komt ook goed van pas voor het nauwkeurig uitzetten van aaltjes over kleinere oppervlaktes. **Klik hier om meer te lezen over de AquaNemix 1.25V.** **Houdbaarheid** Wij adviseren om de aaltjes zo snel mogelijk na ontvangst te gebruiken. Wilt u ze toch langer opslaan dan kunt u ze bewaren in een koelkast (2-8 graden). Op de verpakking staat de uiterste gebruiksdatum. **Website** www.biobestrijding.nl/?post_type=product&p